



全体情報


BP 平均 (気エネルギー)



AP 平均 (自律神経系)



IQ 平均 (免疫機能)



左/右比と上/下比(全身バランス)

| | 左/右比 | 上/下比 |
|----|---------|---------|
| BP | 0.988 | 0.906 < |
| AP | 0.698 < | 2.266 > |
| IQ | 0.847 < | 0.888 < |


虚・実・不安定・逆転の経絡

| BP | 虚 | 実 |
|----|--------|--------|
| 経絡 | 大腸, 胆経 | 肝経, 脾経 |
| BP | 不安定 | 逆転 |
| 経絡 | 肝経, 腎経 | 心包 |


チャクラタイプ

マニプラ2(覚醒化)

左/右比・上/下比と陰陽逆転経絡の図



レーダーチャート BP



内側の破線円は全身平均値 BP = 2108

氏名: 年齢: 42 性別: 男

測定日: 2007/09/12 11:12:32

メモ: 右薬指、小指 肌荒れ

BP 全体情報


| | | |
|-------------|---------------|-------|
| 平均 | 上/下比 | 左/右比 |
| 2062 < 2108 | 0.906 < 0.950 | 0.988 |

チャクラタイプ

| 臓器 | 経絡 | | 虚 | | 実 | | 不安定 | | 逆転 | | チャクラ | 合計 | 判定 |
|-----------------|----|----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---------|-------|-----|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| 松果体, 脳下垂体, 視床下部 | 膀胱 | 小腸 | | | | | | | | | アジナ | | |
| 呼吸器, 皮膚 | 肺経 | 大腸 | | ** | | | | | | | ヴィシュダ | ** | |
| 循環器 | 心経 | 心包 | | | | | | | | ** | アナハタ | ** | |
| 消化器 | 脾経 | 胃経 | | | * | | | | | | マニプラ1 | * | |
| 筋, 骨格 | 肝経 | 胆経 | | * | ** | | ** | | | | マニプラ2 | ***** | 覚醒化 |
| 泌尿生殖器 | 腎経 | 膀胱 | | | | | * | | | | スワディスタナ | * | |
| 全身 | 心包 | 三焦 | | | | | | | ** | | 全身 | ** | |

覚醒化: チャクラが目覚めている可能性が高い。

未覚醒: 気の次元で不安定だが、チャクラが霊的な次元で目覚める可能性がある。



マニプラ2(覚醒化)

各チャクラタイプの体質・性格

| | |
|---|----------------|
| チャクラタイプ: マニプラ2 (覚醒化) | |
| 関係する臓器: 筋, 骨格 | 関係する経絡: 肝経, 胆経 |
| <p>このチャクラタイプの人の体質・性格:</p> <p>マニプラが不安定に動く時、内向的、消極的、受動的で、感情の起伏が大きくなり、感情のコントロールが難しく、憑依され易い。また、消化器系の異常が生じ易い。マニプラ1(脾経、胃経)は、胃、脾と関係が深く、憑依現象、内向性、感情に関係する。マニプラ2(肝経、胆経)は、感情が積極的、攻撃的に働き、筋肉機能と関係が深い。</p> <p>マニプラが目覚めると、消化器系が健全化し、ESP能力が発現し、感情のコントロールが利き、情感に富み優しくなる。</p> | |
| <p>*1 ただし、5回以上を2、3ヵ月間に測定して、その内で最も多く示されるチャクラタイプを本人の基本的チャクラタイプとする。</p> <p>*2 各チャクラに対応する体質・性質・霊的能力については、本山博著「チャクラの覚醒と解脱」の各チャクラに関する項を是非お読みください。</p> | |

氏名: 年齢: 42 性別: 男
 測定日: 2007/09/12 11:12:32
 メモ: 右薬指、小指 肌荒れ

各経絡の左右平均、左、右、左右差値の順位

BP

| 順位 | 左右平均値 | | 基準値 | 左 | | 右 | | 左右差 | | | |
|----|-------|--------|-----|----|--------|----|------|-----|------|----|------|
| 1 | 肝経 | 2412.0 | +2 | 肺経 | 2173.4 | 脾経 | 2412 | 肝経 | 2508 | 肝経 | -192 |
| 2 | 脾経 | 2409.5 | 0 | 脾経 | 2113.1 | 肝経 | 2316 | 脾経 | 2407 | 腎経 | -181 |
| 3 | 八愈 | 2303.0 | +5 | 肝経 | 2112.8 | 八愈 | 2302 | 八愈 | 2304 | 大腸 | -175 |
| 4 | 腎経 | 2166.5 | 0 | 腎経 | 1926.9 | 胃経 | 2143 | 腎経 | 2257 | 心経 | 97 |
| 5 | 胃経 | 2123.0 | +4 | 心経 | 1903.1 | 膀胱 | 2093 | 胃経 | 2103 | 胆経 | -52 |
| 6 | 膀胱 | 2069.5 | +8 | 胆経 | 1851.3 | 心経 | 2084 | 三焦 | 2084 | 三焦 | -50 |
| 7 | 三焦 | 2059.0 | +6 | 大腸 | 1849.5 | 心包 | 2081 | 膀胱 | 2046 | 心包 | 48 |
| 8 | 心包 | 2057.0 | +2 | 八愈 | 1809.2 | 腎経 | 2076 | 心包 | 2033 | 膀胱 | 47 |
| 9 | 心経 | 2035.5 | -4 | 胃経 | 1791.5 | 三焦 | 2034 | 胆経 | 2029 | 胃経 | 40 |
| 10 | 肺経 | 2010.0 | -9 | 心包 | 1787.6 | 小腸 | 2025 | 肺経 | 2004 | 小腸 | 37 |
| 11 | 小腸 | 2006.5 | +1 | 膈愈 | 1763.8 | 肺経 | 2016 | 小腸 | 1988 | 膈愈 | 16 |
| 12 | 胆経 | 2003.0 | -6 | 小腸 | 1728.7 | 膈愈 | 1982 | 心経 | 1987 | 肺経 | 12 |
| 13 | 膈愈 | 1974.0 | -2 | 三焦 | 1726.9 | 胆経 | 1977 | 大腸 | 1972 | 脾経 | 5 |
| 14 | 大腸 | 1884.5 | -7 | 膀胱 | 1699.2 | 大腸 | 1797 | 膈愈 | 1966 | 八愈 | -2 |

各経絡の左右平均、左、右、左右差値の順位

AP

| 順位 | 左右平均値 | | | 左 | | 右 | | 左右差 | |
|----|-------|------|--|----|----|----|----|-----|-----|
| 1 | 肺経 | 37.5 | | 肺経 | 29 | 肺経 | 46 | 膈愈 | -25 |
| 2 | 小腸 | 33.0 | | 大腸 | 28 | 膈愈 | 42 | 心経 | -18 |
| 3 | 心経 | 31.0 | | 心包 | 25 | 小腸 | 42 | 小腸 | -18 |
| 4 | 膈愈 | 29.5 | | 小腸 | 24 | 心経 | 40 | 肺経 | -17 |
| 5 | 心包 | 27.5 | | 心経 | 22 | 心包 | 30 | 腎経 | -12 |
| 6 | 大腸 | 26.5 | | 三焦 | 19 | 三焦 | 28 | 三焦 | -9 |
| 7 | 三焦 | 23.5 | | 膈愈 | 17 | 大腸 | 25 | 胆経 | 6 |
| 8 | 肝経 | 18.0 | | 肝経 | 16 | 肝経 | 20 | 心包 | -5 |
| 9 | 脾経 | 15.5 | | 脾経 | 14 | 腎経 | 20 | 八愈 | -5 |
| 10 | 腎経 | 14.0 | | 胆経 | 14 | 脾経 | 17 | 肝経 | -4 |
| 11 | 胃経 | 12.0 | | 膀胱 | 12 | 胃経 | 14 | 胃経 | -4 |
| 12 | 八愈 | 11.5 | | 胃経 | 10 | 八愈 | 14 | 膀胱 | 4 |
| 13 | 胆経 | 11.0 | | 八愈 | 9 | 胆経 | 8 | 大腸 | 3 |
| 14 | 膀胱 | 10.0 | | 腎経 | 8 | 膀胱 | 8 | 脾経 | -3 |

氏名: 年齢: 42 性別: 男

測定日: 2007/09/12 11:12:32

メ: 右薬指、小指 肌荒れ

各経絡の左右平均、左、右、左右差値の順位

IQ

| 順位 | 左右平均値 | | | | 左 | | 右 | | 左右差 | |
|----|-------|--------|--|--|----|------|----|------|-----|------|
| 1 | 脾経 | 2155.0 | | | 脾経 | 2169 | 腎経 | 2452 | 心経 | -873 |
| 2 | 肝経 | 2113.5 | | | 大腸 | 1916 | 心経 | 2451 | 腎経 | -711 |
| 3 | 腎経 | 2096.5 | | | 膀胱 | 1868 | 肝経 | 2444 | 肝経 | -661 |
| 4 | 心経 | 2014.5 | | | 肝経 | 1783 | 心包 | 2157 | 膈俞 | -604 |
| 5 | 大腸 | 1986.0 | | | 八俞 | 1758 | 膈俞 | 2142 | 小腸 | -502 |
| 6 | 心包 | 1937.5 | | | 腎経 | 1741 | 脾経 | 2141 | 心包 | -439 |
| 7 | 膈俞 | 1840.0 | | | 心包 | 1718 | 大腸 | 2056 | 三焦 | -263 |
| 8 | 膀胱 | 1840.0 | | | 胃経 | 1623 | 小腸 | 2037 | 大腸 | -140 |
| 9 | 小腸 | 1786.0 | | | 心経 | 1578 | 膀胱 | 1812 | 肺経 | 130 |
| 10 | 八俞 | 1775.5 | | | 膈俞 | 1538 | 八俞 | 1793 | 胃経 | -69 |
| 11 | 胃経 | 1657.5 | | | 小腸 | 1535 | 胃経 | 1692 | 膀胱 | 56 |
| 12 | 胆経 | 1497.5 | | | 胆経 | 1485 | 三焦 | 1609 | 八俞 | -35 |
| 13 | 三焦 | 1477.5 | | | 三焦 | 1346 | 胆経 | 1510 | 脾経 | 28 |
| 14 | 肺経 | 627.0 | | | 肺経 | 692 | 肺経 | 562 | 胆経 | -25 |

AMI測定データ一覧

| | BP | | AP | | IQ | | TC | |
|----|------|------|----|----|------|------|----|---|
| | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 |
| 肺経 | 2016 | 2004 | 29 | 46 | 692 | 562 | 5 | 6 |
| 大腸 | 1797 | 1972 | 28 | 25 | 1916 | 2056 | 8 | 8 |
| 心包 | 2081 | 2033 | 25 | 30 | 1718 | 2157 | 7 | 9 |
| 膈俞 | 1982 | 1966 | 17 | 42 | 1538 | 2142 | 7 | 8 |
| 三焦 | 2034 | 2084 | 19 | 28 | 1346 | 1609 | 6 | 7 |
| 心経 | 2084 | 1987 | 22 | 40 | 1578 | 2451 | 7 | 8 |
| 小腸 | 2025 | 1988 | 24 | 42 | 1535 | 2037 | 7 | 9 |
| 脾経 | 2412 | 2407 | 14 | 17 | 2169 | 2141 | 8 | 8 |
| 肝経 | 2316 | 2508 | 16 | 20 | 1783 | 2444 | 7 | 8 |
| 胃経 | 2143 | 2103 | 10 | 14 | 1623 | 1692 | 7 | 7 |
| 八俞 | 2302 | 2304 | 9 | 14 | 1758 | 1793 | 7 | 7 |
| 胆経 | 1977 | 2029 | 14 | 8 | 1485 | 1510 | 7 | 7 |
| 腎経 | 2076 | 2257 | 8 | 20 | 1741 | 2452 | 7 | 9 |
| 膀胱 | 2093 | 2046 | 12 | 8 | 1868 | 1812 | 8 | 7 |

氏名: 年齢: 42 性別: 男

測定日: 2007/09/12 11:12:32

メモ: 右薬指、小指 肌荒れ

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------|-------|-------|-------|-----|
| 診断と治療 BP(1) | | 1686 | 1874 | 2062 | | |
| 全身平均 BP(気エネルギー) | | 2108 | | | | |
| 診断 | 病気が進行していて、全身の気エネルギーがいっぱいに動いている。 | | | | | |
| 治療 | 逆転を示す陰経の気エネルギーを増加せしめるには、28経絡中で、最実を示す経絡の原穴を刺戟し、最虚および逆転を示す経絡の愈穴を刺戟するとよい。また、逆転を示す陰の経絡の気エネルギーを増加せしめるには、経絡体操をするとよい。 | | | | | |
| | | 下半身 | 0.950 | 1.000 | 1.050 | 上半身 |
| BP 上/下比 | | 0.906 | | | | |
| 診断 | 憂鬱になりやすい。気力がでない。 | | | | | |
| 治療 | 百会に置針、灸をする。虚の経絡の募穴を刺戟すると上半身の気エネルギーが増加する。ヨーガの瞑想でアジナチャクラに精神集中する。 | | | | | |
| | | 右半身 | 0.950 | 1.000 | 1.050 | 左半身 |
| BP 左/右比 | | 0.988 | | | | |
| 診断 | 正常範囲 | | | | | |
| 治療 | 正常 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|----|-----------------|--|--|
| 診断と治療 BP(2) | | | | | |
| 陰陽経絡の逆転 | | | | | |
| | | | | | |
| 診断 | 心臓(器質的)に機能異常、疾病のあることが予想される。 | | | | |
| 治療 | 逆転を示す陰経の気エネルギーを増加せしめるには、28経絡中で、最実を示す経絡の原穴を刺戟し、最虚および逆転を示す経絡の愈穴を刺戟するとよい。また、逆転を示す陰の経絡の気エネルギーを増加せしめるには、経絡体操をするとよい。 | | | | |
| 最実経絡と治療点 | | | | | |
| 最実経絡 | 肝経(BP)=2412.0 | 治療 | 太衝 | | |
| 位置 | 足背 第1・第2中足骨底間の前 陥凹部の動脈拍動部 | | | | |
| 最虚経絡と治療点 | | | | | |
| 最虚経絡 | 大腸(BP)=1884.5 | 治療 | 大腸愈 / 天枢に磁気絆を貼る | | |
| 位置 | 大腸愈: 第4・第5腰椎棘突起間の外1寸5分 / 天枢: 臍の外2寸 | | | | |
| チャクラタイプと治療法 | | | | | |
| チャクラ | マニブラ2(覚醒化) | | | | |
| 治療 | 虚の経絡は、実の経絡の原穴刺激で、気エネルギーを増加せしめる。実の経絡の気エネルギーを減らすには、虚の経絡の募穴を刺激する。不安定の経絡の左右差を減らすには、虚の経絡の愈穴を刺激する。 | | | | |

氏名: 年齢: 42 性別: 男
 測定日: 2007/09/12 11:12:32
 メモ: 右薬指、小指 肌荒れ

| 診断と治療 AP | | 6 | 11 | 16 |
|-------------------|---|-------|-------|-----------|
| 全身平均 AP(自律神経系) | | | 21 | |
| 診断 | 高血圧、活動タイプが予想される(自律神経)。 | | | |
| 治療 | ナディ・ショーダン・プラナヤーマで、気のエネルギーと自律神経系の上下・左右のバランスをとるとよい。 | | | |
| | 下半身 | 0.950 | 1.000 | 1.050 上半身 |
| AP 上/下比 2.266 | | | | |
| 診断 | 不眠になりやすい、自律神経失調になりやすい。 | | | |
| 治療 | 自律神経失調を改善するにはナディ・ショーダン・プラナヤーマがよい。 | | | |
| | 右半身 | 0.950 | 1.000 | 1.050 左半身 |
| AP 左/右 0.698 | | | | |
| 診断 | 左半身の副交感神経の緊張、あるいは右半身の交感神経の緊張。 | | | |
| 治療 | パワムクタアサーナがよい。 | | | |

| 診断と治療 IQ | | 1129 | 1358 | 1587 |
|------------------|---|-------|-------|-----------|
| 全身平均 IQ(免疫機能) | | | 1772 | |
| 診断 | 病気あるいはアレルギー、炎症が予想される(免疫系)。 | | | |
| 治療 | ナディ・ショーダン・プラナヤーマで、気のエネルギーと自律神経系の上下・左右のバランスをとるとよい。基本の経絡体操。股関節、仙骨の矯正体操。 | | | |
| | 下半身 | 0.950 | 1.000 | 1.050 上半身 |
| IQ 上/下比 0.888 | | | | |
| 診断 | 下半身で免疫機能亢進、あるいは、上半身で免疫機能の低い、異常な臓器がある場合もある。 | | | |
| 治療 | 免疫機能と関係の深い三焦経の募穴・石門、原穴・陽池への灸が効果を示す場合が多い。丹田呼吸が有効。 | | | |
| | 右半身 | 0.950 | 1.000 | 1.050 左半身 |
| IQ 左/右比 0.847 | | | | |
| 診断 | 左半身の免疫系の低下、あるいは右半身の免疫系の興奮。 | | | |
| 治療 | ナディ・ショーダン・プラナヤーマがよい。偏りを無くすため、股関節、仙骨の経絡体操をすると良い。 | | | |

氏名: 年齢: 42 性別: 男
 測定日: 2007/09/12 11:12:32
 メモ: 右薬指、小指 肌荒れ